Bisceglie, 04/03/2022

Andria
Barletta
Bisceglie
Canosa di Puglia
Margherita di Savoia
Minervino Murge
S. Ferdinando di Puglia
Spinazzola
Trani
Trinitapoli

Azienda
Sanitaria Locale BAT

70031 Andria
Via Fornaci, 201
Tel. 0883.299.750
Fax 0883.299.461

P.IVA 06391740724
Cod.Fisc. 90062670725

Dipartime
nto di Prevenzione

Servizio Igiene e Sanità
Pubblica

76011 Bisceglie
Via degli Aragonesi c/o
CPT
Don Pierino Arcieri

Tel. 080/336.3406
080/336.3419
080/336.3420

uff.igiene.bisceglie@aslbat.it

REGIONE PUGLIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE BT
Servizio di Igiene e Sanità Pubblica Bisceglie

Cari genitori,

vi scriviamo per invitare vostro/a figlio/a alla vaccinazione previste in eta' adolescenziale.

L'adolescenza è un momento molto importante sia per la somministrazione di richiami di vaccinazioni già effettuate nell'infanzia, sia per nuove vaccinazioni da effettuare elettivamente in questo periodo della vita.

È raccomandata per tutti gli adolescenti l'immunizzazione contro difterite, tetano, pertosse e poliomielite utilizzando vaccini combinati con dosaggi antigenici previsti per l'adulto.

Risulta fondamentale anche verificare lo stato vaccinale per morbillo, parotite e rosolia, ed iniziare o completare eventuali cicli vaccinali incompleti somministrando 1 o 2 dosi del vaccino secondo necessità.

Il dodicesimo anno di vita è l'età preferibile per l' offerta attiva della vaccinazione **anti-HPV** a tutta la popolazione (femmine e maschi). Sulla base delle nuove e importanti evidenze scientifiche, infatti, la **Sanità Pubblica** oggi si pone come obiettivo **l'immunizzazione di adolescenti di entrambi i sessi**, per la massima protezione da tutte le patologie HPV correlate direttamente prevenibili con la vaccinazione .

L'hpv è responsabile infatti di tumori sia maligni (il tumore più frequente è quello del collo dell'utero nella donna ma di non trascurabile importanza è il rischio di insorgenza di tumori maligni ano-genitali e del cavo orale negli uomini) che benigni (come i condilomi o verruche ano-genitali).

In funzione dell'età e del vaccino utilizzato, la schedula vaccinale prevede la somministrazione di due dosi a 0 e 6 mesi (a partire dall'undicesimo anno di eta' compiuto fino a 14 anni di eta' compiuti).

È inoltre molto importante che durante l'adolescenza sia raccomandata ed effettuata una dose di vaccino anti-meningococcico quadrivalente ACYW135 e la vaccinazione contro la meningite B che prevede una scheda a due dosi da somministrare a tempo 0-6 mesi.

Distinti Saluti

Dott.ssa Rosa Mongelli

Dott.ssa Daniela Prota

Dipartimento di Prevenzione ASLBT
SISP BISCEGLIE

Mail: uff.igiene.bisceglie@aslbt.it